

Lernerfolgskontrolle
24. November 2021, 17:30 – 19:45 Uhr

„Atopische Dermatitis – ein Fall für den Allergologen“

LÖSUNGSBOGEN

Frage 1

Eine typische Nebenwirkung bei der Gabe von Dupilumab ist?

- Kopfschmerzen.
- in 10% eine länger anhaltende Konjunktivitis.**
- Gelenkschmerzen.
- Durchfälle.
- erhöhte Leberwerte.

Frage 2

Tralokinumab für die Behandlung der Atopischen Dermatitis ist ein:

- IL-17 Antikörper.
- IL-23 Antikörper.
- IL-13 Antikörper.**
- IL-12 Antikörper.
- IL-8-Antikörper.

Frage 3

Baricitinib ist ein:

- IL-17 Antikörper.
- IL-23 Antikörper.
- ein selektiver JAK-1 Inhibitor.**
- ein IL-4 Rezeptorantagonist.
- IL-12 Antikörper.

Frage 4

Wann kann ich die Diagnose Neurodermitis/atopisches Ekzem stellen?

- Wiederkehrende Ekzeme vorwiegend im Beugenbereich mit Juckreiz.**
- Erhöhtes IgE.
- Ekzem mit Comorbidität Rhinoconj. Allergica.
- Ekzem mit Comorbidität Allerg. Asthma bronchiale.
- Ekzem im Beugenbereich.

Frage 5

Wann sollte ich eine Basistherapie empfehlen – was ist **falsch**?

- Xerosis.
- Atopischem Ekzem.
- Akne inversa.
- Rhinoconjunctivitis allergica.
- Allergisches Asthma.

Frage 6

Was sollte eine optimale Basistherapie enthalten?

- Fettende, hydratisierende Inhaltsstoffe.
- Fettende, hydratisierende, filmbildende Inhaltsstoffe.
- Fettende Inhaltsstoffen, die die Hautbarriere nachahmen.
- Hydratisierende Stoffe wie Urea und Glycerin.
- Juckreizstillende und hydratisierende Inhaltsstoffe.

Frage 7

Wie viel Prozent der erwachsenen Bevölkerung leidet derzeit unter einem atopischen Ekzem (alle Formen von mild bis schwer ausgeprägt)?

- ca. 0,002%.
- ca. 0,02%.
- ca. 0,2%.
- ca. 2%.
- ca. 20%.

Frage 8

Welche Angabe zur Allergiediagnostik bei atopischem Ekzem ist **falsch**?

- Die Anamnese kann zum V.a. klinisch relevanter Allergien bei atopischem Ekzem führen.
- Spezifische IgE Antikörper können klinische Relevanz für das Ekzem haben.
- Der beste Routinetest zur Aufdeckung einer relevanten Sensibilisierung bei atopischem Ekzem ist der Atopie-Patch-Test.
- Der orale Provokationstest kann klinisch relevante Soforttypreaktionen, die mit atopischem Ekzem assoziiert sein können, aufdecken.
- Der Provokationstest kann klinisch relevante Spättypreaktionen, die mit Ekzem Verschlimmerung assoziiert sind, aufdecken.

Frage 9

Welche Aussage ist **falsch**?

- Das Das seborrhoische Ekzem ist eine relevante Differentialdiagnose des atopischen Ekzems.
- Das atopische Ekzem ist keine Kontraindikation für eine Impfung.
- Typische Prädilektionsstellen des Ekzems sind u.a. Gesicht und Streckseiten sowie der Rumpf.
- Die Regression des atopischen Ekzems liegt im Kindesalter bei ca. 5%.
- Basis Externa mit hydrophiler Grundlage sind indiziert beim akuten nässenden Ekzem, mit lipophiler Grundlage beim chronisch trockenen Ekzem.

Frage 10

Welche Angabe zur nicht-infektiösen Otitis externa ist falsch? Eine nicht-infektiöse Otitis externa kann Ausdruck sein einer...

- ...allergischen Kontaktdermatitis im Gehörgang (z. B. bei Kontaktallergie auf Haarfärbemittel oder externe Arzneimittel).
- ...atopische Dermatitis des Gehörganges.
- ...Stauungsdermatitis durch dilatierte Venolen bei Hypertonie im Gehörgang.
- ...Exsikkationsdermatitis des Gehörganges.
- ...seborrhoischen Dermatitis des Gehörganges.