

**Lernerfolgskontrolle**  
**8. März 2023, 18:00 – 20:15 Uhr**

**„Allergie ganz praktisch: Von der Diagnostik zur  
Therapie“**

Bitte senden Sie das ausgefüllte Dokument **bis Freitag, den 10. März 2023** zurück an [kongressorganisation@allergiezentrum.org](mailto:kongressorganisation@allergiezentrum.org).

---

*Titel, Vorname, Name*

---

*Ort*

-----  
*Ihre EFN-Nummer (15-stellig)*

**Frage 1**

**Eine allergenspezifische IgE- Bestimmung**

- identifiziert Allergenquellen.
- hilft bei der Auswahl der richtigen Therapieoptionen.
- weist klinisch relevante Allergien nach.
- ist besonders geeignet zur Verlaufskontrolle von Asthma.
- Alle Aussagen sind richtig.

**Frage 2**

**Welche positiv getesteten Allergenquellen muss ich behandeln?**

- Pollen.
- Milbe.
- Soja.
- Alle.
- nur die, auf die der Patient reagiert.

### Frage 3

**Für welche Fragestellung ist eine Molekulare Allergiediagnostik sinnvoll?**

- Zur Verlaufskontrolle der Immuntherapie.
- Zur Risikoabschätzung bei Nahrungsmittelintoleranzen.
- Zur Evaluierung von Kreuzreaktivitäten bei Polyallergie.
- Bei schwerer Kontaktallergie.
- Keine der obigen Antworten ist richtig.

### Frage 4

**Die Hauptallergene der Hausstaubmilbe sind**

- Der p 1, Der p 7, Der p 10.
- Der p 1, Der p 2, Der p 23.
- Argininesterasen.
- Der p 10, Der p 20, Der p21.
- Keines der obengenannten.

### Frage 5

**Die wichtigsten Asthmaauslöser unter den Felltierallergenen sind**

- Serumalbumine.
- Profiline.
- Argininesterasen.
- Lipocaline.
- Keines der obengenannten.

### Frage 6

**Welche Aussagen zur nasalen Allergenprovokation trifft *nicht* zu?**

- Bei der nasalen Allergenprovokation werden die Symptome der allergischen Reaktion unter kontrollierten Bedingungen reproduziert
- Bei einer nasalen Allergenprovokation muss immer eine Kontrollprovokation durchgeführt werden
- Das Allergen soll bei der nasalen Allergenprovokation nur mit Sprühflaschen appliziert werden
- Eine Inspektion der Nase ist vor der nasalen Allergenprovokation nicht erforderlich
- Zur Bewertung der Ergebnisse einer nasalen Allergenprovokation werden nur die Symptome der Patienten herangezogen

### Frage 7

**Welche Aussage zur lokalen allergischen Rhinitis (LAR) trifft *nicht* zu?**

- Der Nachweis von spezifischem IgE im Nasensekret ist erforderlich, um eine LAR zu diagnostizieren
- Die medikamentöse Therapie der allergischen Rhinitis unterscheidet sich nicht von der Behandlung der allergischen Rhinitis
- Eine allergenspezifische Immuntherapie ist grundsätzlich eine Therapieoption bei LAR
- Wenn bei negativem Hauttest und spezifischem IgE im Serum die nasale Allergenprovokation positiv ausfällt, kann eine LAR diagnostiziert werden
- Aus einer LAR kann sich im weiteren klinischen Verlauf eine „normale“ allergische Rhinitis entwickeln

### Frage 8

**Welche Kontraindikation zur Allergenimmuntherapie (AIT) wird in der aktuellen Leitlinie zur Allergenimmuntherapie (2022) *nicht* genannt?**

- Unzureichende Compliance, schwere psychiatrische Erkrankungen
- Unkontrolliertes Asthma
- Therapie mit Betablockern
- Schwerwiegende Systemreaktionen (Grad 4 und 5 nach WAO) bei AIT in der Vergangenheit
- Maligne neoplastische Erkrankungen mit aktuellem Krankheitswert

### Frage 9

**Welche Aussage zur allergischen Rhinitis trifft zu?**

- Riechstörungen können ein häufiges Symptom bei allergischer Rhinitis sein
- Mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung leidet an allergischer Rhinitis
- Eine Sensibilisierung gegen Ambrosiapollen ist eine der drei häufigsten Ursachen der allergischen Rhinitis in Deutschland
- Eine Allergenimmuntherapie sollte bei allergischer Rhinitis nur angewandt werden, wenn ein Asthma bronchiale ausgeschlossen wurde
- Ein negativer Hauttest schließt das Vorliegen einer allergischen Rhinitis sicher aus

### Frage 10

**Welches Kriterium ist bei der Indikation zur Allergenimmuntherapie *nicht* relevant?**

- Moderate bis schwere intermittierende und persistierende allergische Rhinitis/Rhinokonjunktivitis und/oder zumindest teilkontrolliertes allergisches Asthma
- Nachweis einer korrespondierenden klinisch relevanten Sensibilisierung
- Symptome trotz symptomatischer Therapie und/oder Maßnahmen der Allergenkarenz
- Wirksamkeitsnachweis der geplanten AIT für die jeweilige Indikation und Altersgruppe
- Lebensalter unter 70 Jahre

**Bitte senden Sie das ausgefüllte Dokument bis Freitag, den 10. März 2023 zurück an [kongressorganisation@allergiezentrum.org](mailto:kongressorganisation@allergiezentrum.org).**